

SES-RJ - RJ - 2018 - R1 - 1

Questão 1

Paciente de 56 anos com sobrepeso e diabetes mellitus tipo 2 será submetido à colecistectomia eletiva em uma semana. Faz uso de metformina no desjejum e no almoço. Na consulta pré-operatória, a paciente fica sabendo que a cirurgia será iniciada às 13h. A última dose do hipoglicemiante oral deverá ser usada no(a):

- A) manhã da cirurgia
- B) almoço da véspera
- C) almoço do dia da cirurgia
- D) café da manhã da véspera

RESPOSTA: Letra B

Questão 2

Homem de 30 anos com rinite alérgica procura atendimento devido à tosse, há 20 dias, que piora ao deitar. A radiografia do tórax é normal e a dos seios da face revela nível hidroaéreo no seio maxilar direito. O antibiótico a ser prescrito como primeira escolha é:

- A) ciprofloxacina
- B) amoxicilina
- C) cefuroxima
- D) doxiciclina

RESPOSTA: Letra B

Questão 3

Paciente de 42 anos será submetida à cirurgia plástica para correção de cicatriz na face, causada por mordida de cachorro há três anos. Nos exames pré-operatórios o cirurgião nota presença de 100 mil colônias de E. coli na urina, sensível a cefalosporinas e quinolonas e, por isso, pede parecer ao urologista. Ela está assintomática e usa apenas um hipoglicemiante oral; o exame físico está normal, exceto por IMC = 31. A melhor conduta é:

- A) liberar a cirurgia sem tratamento
- B) prescrever ciprofloxacina
- C) prescrever ceftriaxona
- D) solicitar nova cultura

RESPOSTA: Letra A

Questão 4

Paciente de 38 anos vai à consulta devido à dor abdominal recorrente que se iniciou há alguns anos. Refere que tem diarreia intermitente, sem muco, pus ou sangue, que a dor melhora após a evacuação, e que emagreceu moderadamente (5% do peso inicial) durante o último ano. Eventualmente tem aftas que duram uma semana. O médico considera o diagnóstico de síndrome do cólon irritável. O critério relevante para o diagnóstico fornecido na história é:

- A) dor que alivia com a evacuação
- B) emagrecimento moderado
- C) diarreia sem muco
- D) aftas orais

RESPOSTA: Letra A

Questão 5

Homem de 68 anos procura ambulatório com história de doença diverticular do cólon, com várias crises anteriores, para tentar melhorar sua qualidade de vida e diminuir a frequência das crises. Tem cerca de sete crises ao ano, tendo a última ocorrido há 45 dias. A melhor prescrição para diminuir as recorrências, nesse paciente, é:

- A) sulfametoxazol com trimetoprin
- B) colestiramina
- C) racecadotril
- D) mesalazina

RESPOSTA: Letra D

Questão 6

Ao avaliar exames de sangue de um paciente com doença hepática, o dado que indicaria que a doença é crônica é o(a):

- A) albumina baixa
- B) gamaglutamil transferase normal
- C) tempo de atividade de protrombina alargado
- D) transaminase glutâmico pirúvica muito elevada

RESPOSTA: Letra A

Questão 7

Paciente de 45 anos com esteato-hepatite não alcoólica busca orientação quanto ao tratamento de sua doença, sendo esclarecido que os melhores resultados são obtidos através de:

- A) perda de peso
- B) uso de metformina
- C) uso de rosiglitazona
- D) reposição de vitamina E

RESPOSTA: Letra A

Questão 8

Mulher de 52 anos dá entrada na emergência com quadro de pancreatite aguda grave. Nesses casos a reposição vigorosa de fluidos tem importante fator prognóstico. Para monitorar essa reposição, os melhores parâmetros laboratoriais a serem utilizados a cada 8 a 12h o início da reposição da ureia (BUN) e:

- A) lactato
- B) albumina
- C) creatinina
- D) hematócrito

RESPOSTA: Letra D

Questão 9

Paciente de 30 anos apresenta quadro de dor nas interfalangeanas proximais, rigidez matutina com mais de uma hora de duração e títulos altos de anti-CCP. Uma das drogas conhecidas como “modificadoras da doença” e que não retarda sua progressão radiológica é:

- A) leflunomida
- B) metotrexate
- C) sulfasalazina
- D) hidroxicloroquina

RESPOSTA: Letra D

Questão 10

A psicose em pacientes com LES e que estão usando corticoide pode ocorrer:

- A) após sua retirada
- B) após poucas semanas de seu início
- C) concomitantemente a outros parafarmacos
- D) concomitantemente à melhora da doença renal

RESPOSTA: Letra B

Questão 11

Homem branco de 28 anos refere que sua mãe perdeu várias gestações e faleceu aos 48 anos de tromboembolismo pulmonar. Relata ter enxaqueca desde a adolescência. Traz exame de anticoagulante lúpico positivo em duas ocasiões diferentes. O medicamento a ser indicado, para esse paciente, é:

- A) fondaparinux caso o anticoagulante lúpico dê positivo em três meses
- B) rivaroxabana em caso de viagens longas de avião
- C) wafarin após o primeiro evento tromboembólico
- D) AAS na primeira consulta

RESPOSTA: Letra C

Questão 12

Paciente de 26 anos procura emergência por nervosismo e taquicardia. Ao exame físico, apresentou exoftalmia, mãos úmidas e trêmulas, FC = 140bpm, TAX 37,2°C. O exame neurológico identificou desorientação, agitação e hiperreflexia. Após ser internado, foi medicado com propiltiouracil e, para aproveitar o efeito conhecido como Wolf-Chaikoff, foi administrado:

- A) lítio
- B) metimazol
- C) propranolol
- D) iodeto de potássio

RESPOSTA: Letra D

Questão 13

Paciente de 38 anos desenvolve quadro de intolerância à glicose, obesidade central, osteoporose, amenorreia e hipertensão arterial sistêmica durante os últimos 12 meses. O exame inicial para investigar esse quadro deve ser dosagem de:

- A) cortisol plasmático basal
- B) hormônio adrenocorticotrófico (ACTH)
- C) cortisol livre em amostra matinal de urina
- D) cortisol plasmático após dose noturna de dexametasona

RESPOSTA: Letra D

Questão 14

A densitometria óssea deve ser solicitada, de modo geral, em:

- A) mulheres acima de 65 e homens acima de 70 anos
- B) homens e mulheres acima dos 70 anos

C) mulheres acima de 55 anos

D) homens acima de 65 anos

RESPOSTA: Letra A

Questão 15

Faz parte do exame físico aferir a pressão arterial nos membros superiores e inferiores. A pressão arterial sistólica nos membros inferiores, em relação aos superiores, costuma ter uma diferença de:

A) mais de 30mmHg

B) mais de 20mmHg

C) menos de 10mmHg

D) menos de 30mmHg

RESPOSTA: Letra B

Questão 16

Mulher de 38 anos, previamente hígida, queixa-se de início súbito de taquicardia, com tonteira conhecida como “cabeça leve”. Ao ser examinada, apresenta PA = 90 x 60mmHg, FC = 145 e eletrocardiograma com taquicardia de QRS estreito com algumas ondas P negativas, colocadas após o QRS em D2. Inicialmente, tenta-se manobra de Valsalva sem sucesso. A droga de primeira escolha, frequentemente, tem como reação adversa:

A) cefaleia

B) boca seca

C) dor torácica

D) sensação de sufocamento

RESPOSTA: Letra C

Questão 17

Paciente de 25 anos queixa-se de dor precordial difícil de caracterizar. Ao exame físico, tem click mesossistólico, seguido de sopro, que aumenta na fase isovolumétrica da manobra de Valsalva. A dor torácica do paciente deve ser tratada com:

A) digoxina

B) captopril

C) atenolol

D) amiodarona

RESPOSTA: Letra C

Questão 18

Mulher de 38 anos sente, subitamente, forte cefaleia holocraniana e náuseas. A tomografia de entrada mostra hemorragia subaracnoide com lâmina de sangramento de 2mm. A paciente está estável, apresenta Glasgow 15 e é levada ao CTI. A fim de prevenir a complicação mais temida dessa condição, deverá ser iniciado(a):

- A) nimodipina
- B) dexametasona
- C) difenilhidantoína
- D) ácido trenexânico

RESPOSTA: Letra A

Questão 19

Um paciente retorna de viagem a trabalho em Angola e, em poucas semanas, desenvolve quadro de febre e calafrios. Evolui com piora do estado geral e é internado no CTI com hipotensão e hipoxemia. Relata uso profilático de doxiciclina durante sua estadia no país. Suspeita-se que ele esteja com malária. Nesse caso, o melhor método diagnóstico para confirmar essa suspeita é:

- A) gota fina
- B) hemocultura
- C) gota espessa
- D) pesquisa de antígeno

RESPOSTA: Letra D

Questão 20

Uma paciente de 20 anos, pertencente a grupo de risco (múltiplos parceiros sexuais sem uso de preservativo), procura o médico com exame de sorologia para o HIV positivo (anti-HIV ELISA) repetido e confirmado com Western-blot. O médico pede exame de carga viral, imunotipagem linfocitária e genotipagem para o HIV. Em relação ao tratamento nos dias atuais, deve-se recomendar que a paciente inicie o tratamento em caso de:

- A) CD4 menor que 350 células
- B) CD4 menor que 250 células
- C) presença de doença definidora
- D) qualquer contagem de CD4

RESPOSTA: Letra D

Questão 21

Mulher de 55 anos foi submetida à tireoidectomia devido à doença de Graves com sinais de compressão de traqueia. Após a cirurgia, houve quadro clínico de taquicardia, febre, convulsão, confusão mental e vômitos incoercíveis. Nesse caso, a hipótese provável é de:

- A) lesão esofageana
- B) crise tireotóxica
- C) hipotireoidismo
- D) hipocalcemia

RESPOSTA: Letra B

Questão 22

Mulher de 55 anos foi submetida à tireoidectomia devido à doença de Graves com sinais de compressão de traqueia. Após a cirurgia, houve quadro clínico de taquicardia, febre, convulsão, confusão mental e vômitos incoercíveis. A complicação pós-operatória descrita poderia ter sido evitada se houvesse:

- A) estado eutireoideano no pré-operatório
- B) sondagem nasogástrica para o ato operatório
- C) reposição de cálcio imediata no pós-operatório
- D) reposição imediata de hormônio tireoideano no pós-operatório

RESPOSTA: Letra A

Questão 23

Considerando os aspectos ultrassonográficos dos nódulos tireoideanos, as características mais suspeitas de malignidade são:

- A) hipocogenicidade em relação ao parênquima e altura maior que a largura na visão transversal
- B) hipocogenicidade em relação ao parênquima e altura menor que a largura na visão transversal
- C) hiperecogenicidade em relação ao parênquima e altura maior que a largura na visão transversal
- D) hiperecogenicidade em relação ao parênquima e altura menor que a largura na visão transversal

RESPOSTA: Letra A

Questão 24

O enxerto de pele necessita de boa vascularização no local receptor para que haja boa pega no local de enxertia. Um bom leito receptor de enxerto de pele é o(a):

- A) tecido de granulação
- B) cartilagem
- C) periósteo
- D) tendão

RESPOSTA: Letra C

Questão 25

A realização de uma zetaplastia para ressecção de tumor basocelular em dorso tem como objetivo:

- A) ganhar maior profundidade na ressecção
- B) diminuir formação de seroma
- C) suturar a lesão sem tensão
- D) diminuir o sangramento

RESPOSTA: Letra C

Questão 26

Idoso de 80 anos apresenta dor abdominal e diarreia sanguinolenta. Ele faz uso regular de digoxina. Foi solicitada tomografia computadorizada que evidenciou espessamento do ângulo esplênico do cólon. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é de:

- A) proctite
- B) intusseção intestinal
- C) isquemia mesentérica
- D) colite pseudomembranosa

RESPOSTA: Letra C

Questão 27

Paciente apresentou hemorragia digestiva alta limitada, sem repercussões hemodinâmicas. Ele possui história pregressa de DRGE e correção de aneurisma de aorta abdominal realizada há um ano. EDA mostrou evidência de sangramento não ativo em quarta porção duodenal. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é de:

- A) síndrome de Zollinger-Ellison
- B) fístula aortomesentérica
- C) síndrome de Wilkie
- D) GIST duodenal

RESPOSTA: Letra B

Questão 28

Para se organizar a fila de transplante hepático é levada em consideração a pontuação da escala de MELD, que leva em conta os seguintes componentes:

- A) fosfatase alcalina, plaquetas e creatinina
- B) INR, creatinina e bilirrubina
- C) PaO₂, TGO e bilirrubina
- D) lactato, INR e gama-GT

RESPOSTA: Letra B

Questão 29

Um curto-circuito em uma instalação de ar-condicionado evoluiu para incêndio, provocando queimadura circunferencial de um braço, uma perna ipsilateral ao braço e pescoço de um trabalhador. A superfície corporal queimada nesse evento corresponde a:

- A) 19%
- B) 28%
- C) 27%
- D) 37%

RESPOSTA: Letra B

Questão 30

Um curto-circuito em uma instalação de ar-condicionado evoluiu para incêndio, provocando queimadura circunferencial de um braço, uma perna ipsilateral ao braço e pescoço de um trabalhador. O braço acometido pela queimadura encontra-se pálido, muito edemaciado e com diminuição do pulso radial. Nesse caso, está indicada a realização de:

- A) escarotomia com fasciotomia
- B) embolectomia com catéter de balão
- C) colocação de stent via endovascular
- D) escarotomia e colocação de enxerto de pele

RESPOSTA: Letra A

Questão 31

Após as primeiras mamadas, recém-nascido apresenta sialorreia e tosse com engasgos. Sua mãe possuía história de polidrômio ultrassonográfico. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é de:

- A) fístula traqueoesofágica
- B) enfisema congênito lobar

- C) estenose hipertrófica do piloro
- D) hérnia diafragmática congênita

RESPOSTA: Letra A

Questão 32

Paciente apresenta dois nódulos pulmonares, um deles medindo 3cm justa pleural e outro 2cm intraparenquimatoso em lobo esquerdo pulmonar, sugestivos de doença sarcomatosa metástica. Há seis meses, foi realizada ressecção de sarcoma de alto grau em membro inferior esquerdo com preservação do membro. Os exames complementares não evidenciaram doença extrapulmonar. Nesse caso, está indicada a realização de:

- A) radioterapia
- B) quimioterapia
- C) lobectomia esquerda
- D) embolização com yttrium

RESPOSTA: Letra C

Questão 33

Mulher de 40 anos fez trombose venosa profunda (TVP) no primeiro dia após cirurgia de gastroplastia em Y de Roux. No dia seguinte da TVP, precisou ser reabordada por deiscência da sutura lateral do estômago excluído. Ela necessitará de:

- A) uso de compressores pneumáticos após a reabordagem
- B) colocação de filtro de veia cava antes da reabordagem
- C) 24 horas sem heparina antes da reabordagem
- D) uso de protamina após a reabordagem

RESPOSTA: Letra B

Questão 34

Mulher de 40 anos fez trombose venosa profunda (TVP) no primeiro dia após cirurgia de gastroplastia em Y de Roux. No dia seguinte da TVP, precisou ser reabordada por deiscência da sutura lateral do estômago excluído. A paciente evoluiu bem e, após alta hospitalar, apresentou taquicardia, cefaleia e diarreia depois da alimentação. Esses sintomas são consequência do(a):

- A) gastrectomia
- B) tamanho do bypass
- C) anastomose gastrojejunal
- D) anastomose jejunojejunal

RESPOSTA: Letra C

Questão 35

A realização de colangiografia intraoperatória é assunto controverso quanto à sua realização de rotina. Porém, constitui critério para realizá-la quando houver:

- A) ducto de Luschka clipado durante a retirada da vesícula do leito hepático
- B) pólipos da vesícula perto da saída do ducto cístico
- C) vesícula encastrada no leito hepático
- D) dilatação da via biliar

RESPOSTA: Letra D

Questão 36

Homem foi submetido a uma neurocirurgia devido a tumor cerebral. No sétimo dia do pós-operatório, estava sedado, entubado, hemodinamicamente instável e com os parâmetros respiratórios muito comprometidos, apresentando colecistite aguda. Nesse caso, a melhor conduta consiste em realizar uma:

- A) colecistectomia videolaparoscópica
- B) CPRE com papilotomia
- C) colecistectomia aberta
- D) colecistostomia

RESPOSTA: Letra D

Questão 37

Paciente obeso mórbido apresentou pancreatite aguda leve após libação alcoólica. A tomografia computadorizada de abdômen evidenciou um incidentaloma de adrenal direita de 3cm. Considerando a prevalência dessas lesões em adrenal sem sinais de malignidade, é mais provável que esse paciente possua na adrenal direita um:

- A) adenoma não funcionante
- B) feocromocitoma
- C) aldosteronoma
- D) mielolipoma

RESPOSTA: Letra A

Questão 38

No pós-operatório de gastrectomia total devido a carcinoma de fundo gástrico, é mandatória a reposição de:

- A) zinco
- B) magnésio

- C) vitamina E
- D) vitamina B12

RESPOSTA: Letra D

Questão 39

Homem de 20 anos caiu de uma altura de três metros e sofreu trauma cervical e cefálico. Na sala de trauma, evolui com diminuição da escala de coma de Glasgow de 13 para 8 e, ao exame físico, apresentou grande hematoma, expansivo e pulsátil, em região cervical direita. Nesse caso, a conduta mais correta é:

- A) realizar entubação orotraqueal e tomografia com contraste venoso
- B) ventilar com máscara laríngea e realizar arteriografia carotídea
- C) ventilar com máscara de O2 a 100% e ultrassom com Doppler
- D) realizar entubação orotraqueal e cirurgia cervical

RESPOSTA: Letra D

Questão 40

Ao realizar uma cirurgia de hérnia inguinal, o cirurgião encontrou um divertículo de Meckel dentro do saco herniário. Essa hérnia é denominada como:

- A) Litre
- B) Spiegel
- C) Amyand
- D) de Garangeot

RESPOSTA: Letra A

Questão 41

A fórmula utilizada para o cálculo da altura final de meninos, em centímetros, é:

- A) $(\text{altura do pai} + 13) \div 2$
- B) $(\text{altura da mãe} + 13) \div 2$
- C) $(\text{altura do pai} + \text{altura da mãe} - 13) \div 2$
- D) $(\text{altura do pai} + \text{altura da mãe} + 13) \div 2$

RESPOSTA: Letra D

Questão 42

O primeiro sinal de puberdade nas meninas é o aparecimento do broto mamário. Após esse primeiro sinal, a menarca ocorrerá entre:

- A) um ano e meio a dois anos

- B) três anos a três anos e meio
- C) dois anos a dois anos e meio
- D) dois anos e meio a três anos

RESPOSTA: Letra C

Questão 43

A linguagem se desenvolve com maior capacidade de aprendizado e armazenamento de informações em crianças com idade entre:

- A) três e seis anos
- B) dois e seis anos
- C) três e cinco anos
- D) dois e cinco anos

RESPOSTA: Letra D

Questão 44

Segundo o ECA, são consideradas adolescentes pessoas com idade entre:

- A) doze e vinte anos
- B) treze e vinte anos
- C) doze e dezoito anos
- D) treze e dezoito anos

RESPOSTA: Letra C

Questão 45

A definição de recém-nascido de muito baixo peso compreende criança que tem peso de nascimento, em gramas, menor que:

- A) 1.800
- B) 1.500
- C) 1.300
- D) 1.000

RESPOSTA: Letra B

Questão 46

A conduta, para crianças com diagnóstico eritema infeccioso, é:

- A) manter a atividade física normal, com restrição de contato para gestantes, por cinco dias, após o aparecimento do exantema.

B) restrição de atividade física, com restrição de contato para gestantes, por cinco dias, após o aparecimento do exantema.

C) manter a atividade física normal, sem restrição de contato, após o aparecimento do exantema.

D) restrição de atividade física, sem restrição de contato, após o aparecimento do exantema.

RESPOSTA: Letra C

Questão 47

O diagnóstico da doença de Kawasaki é clínico e exige, além da febre persistente por, no mínimo, cinco dias, a presença de:

A) cinco dos cinco achados clínicos principais, independentemente da presença de aneurisma coronariano

B) quatro dos cinco achados clínicos principais, independentemente da presença de aneurisma coronariano

C) quatro dos cinco achados clínicos principais e detecção de presença de aneurisma coronariano

D) cinco dos cinco achados clínicos principais e detecção de presença de aneurisma coronariano

RESPOSTA: Letra B

Questão 48

Em crianças com quadro clínico sugestivo de doença celíaca, o diagnóstico definitivo é feito através de:

A) duas biópsias de intestino delgado antes e após a retirada do glúten

B) duas biópsias de intestino grosso antes e após a retirada do glúten

C) uma biópsia de intestino delgado antes da retirada do glúten

D) uma biópsia de intestino grosso antes da retirada do glúten

RESPOSTA: Letra A

Questão 49

A colestase neonatal é definida como um aumento dos níveis de bilirrubina conjugada que se prolonga por mais de:

A) quatro semanas de vida

B) duas semanas de vida

C) três semanas de vida

D) uma semana de vida

RESPOSTA: Letra B

Questão 50

A papilomatose é a neoplasia respiratória mais comum da infância. Estas verrugas ocorrem devido à infecção pelo papilomavírus humano (HPV) com contaminação durante o trabalho de parto. Os HPVs mais frequentemente envolvidos nesses casos são:

- A) HPV 6 e HPV 11
- B) HPV 6 e HPV 18
- C) HPV 16 e HPV 18
- D) HPV 11 e HPV 16

RESPOSTA: Letra A

Questão 51

A síndrome de Loffler pode estar associada à infecção parasitária por:

- A) Taenia solium
- B) Trichuris trichiuræ
- C) Necator americanus
- D) Enterobius vermicularis

RESPOSTA: Letra C

Questão 52

Das doenças congênitas do coração, em recém-nascidos a termo, a que ocorre com maior frequência é o(a):

- A) defeito do septo ventricular
- B) defeito do septo atrial
- C) coarctação da aorta
- D) tetralogia de Fallot

RESPOSTA: Letra A

Questão 53

Sobre as síndromes constitucionais congênitas que cursam com pancitopenia, a mais frequente é:

- A) Dubowitz
- B) Fanconi
- C) Seckel
- D) Down

RESPOSTA: Letra B

Questão 54

A hepatite B crônica é um fator de risco para o aparecimento de hepatocarcinoma. A característica epidemiológica, associada a um maior risco para o desenvolvimento de desse câncer hepático, é a transmissão:

- A) perinatal
- B) indeterminada
- C) por hemoderivados
- D) por fluidos corpóreos

RESPOSTA: Letra A

Questão 55

Pessoas que viajarão para uma área de risco da febre amarela deverão fazer profilaxia, tomando a vacina seguinte maneira:

- A) uma dose, no mínimo, 10 dias antes da viagem
- B) uma dose, no mínimo, 15 dias antes da viagem
- C) duas doses, no mínimo, 10 dias antes da viagem
- D) duas doses, no mínimo, 15 dias antes da viagem

RESPOSTA: Letra A

Questão 56

Considera-se imunidade passiva homóloga, a administração de anticorpos obtidos de:

- A) um irmão, ou pai e mãe
- B) um doador da comunidade
- C) um ou mais irmãos, ou pai e mãe
- D) um ou mais doadores da comunidade

RESPOSTA: Letra D

Questão 57

O intervalo mínimo entre a administração de imunoglobulina humana antivaricela-zoster e a aplicação da vacina de varicela é de:

- A) quatro meses
- B) cinco meses
- C) seis meses
- D) três meses

RESPOSTA: Letra D

Questão 58

Pessoas com história de reação anafilática sistêmica, após ingestão de ovo (urticária generalizada, hipotensão e/ou obstrução de vias aéreas superiores ou inferiores comprovadas) devem ser vacinadas com precauções. Essa recomendação se aplica para a utilização da vacina:

- A) hepatite A
- B) hepatite B
- C) pólio inativada
- D) gripe inativada

RESPOSTA: Letra D

Questão 59

Os profissionais de saúde podem ser vacinados contra hepatite B sem fazer teste sorológico prévio, devido ao risco de contração da doença por exposição a sangue ou líquidos corporais. Recomenda-se realizar a sorologia entre um a dois meses, após a última dose do esquema vacinal, em todos os profissionais para verificar se houve resposta satisfatória à vacina (anti-AgHBs >10UI/L). No caso de sorologia (anti-AgHBs) negativa, a recomendação é repetir:

- A) uma dose da vacina e não colher sorologia
- B) o esquema de vacina completo e não colher sorologia
- C) uma dose da vacina e, após dois meses, colher sorologia
- D) o esquema de vacina completo e, após dois meses, colher sorologia

RESPOSTA: Letra D

Questão 60

Em crianças com doença granulomatosa crônica, segundo o manual do centro de referência para imunobiológicos especiais (CRIE), é **CONTRAINDICADO** o uso da vacina:

- A) BCG
- B) rotavírus
- C) tríplice viral
- D) febre amarela

RESPOSTA: Letra A

Questão 61

Paciente de 60 anos comparece ao ambulatório de ginecologia com queixa de prurido vulvar. Ao exame ginecológico, apresenta vulva atrófica, com presença de mácula

hipocrômica em face interna de grandes lábios bilateralmente que se estende até região perineal e perianal. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é de:

- A) psoríase
- B) líquen escleroso
- C) candidíase vulvar
- D) dermatite seborreica

RESPOSTA: Letra B

Questão 62

Mulher de 28 anos procura atendimento ginecológico de rotina e durante a anamnese refere que usa anticoncepcional oral combinado indicado por uma amiga. Nesse caso, o anticoncepcional deverá ter **CONTRAINDICADO** caso a paciente apresente:

- A) anemia falciforme
- B) mioma submucoso
- C) enxaqueca com aura
- D) doença fibrocística da mama

RESPOSTA: Letra C

Questão 63

Mulher de 38 anos procura atendimento com queixa de odor vaginal e corrimento. Ao exame, confirma-se presença de secreção escassa homogênea, acinzentada, com odor fétido e pH vaginal de 6,0. Refere já ter feito uso de medicação em episódio semelhante ocorrido anteriormente. Naquele momento, a medicação provocou intolerância gástrica e gosto metálico na boca. Como alternativa a essa medicação, deve ser prescrito:

- A) clindamicina
- B) azitromicina
- C) clotrimazol
- D) tioconazol

RESPOSTA: Letra A

Questão 64

Um dos pontos mais importantes no sucesso da profilaxia da transmissão de doenças virais em mulheres vítimas de violência sexual é o tempo decorrido da agressão e o início da terapia. Para a profilaxia contra HIV, a terapia antirretroviral deve ser administrada impreterivelmente até:

- A) 5 dias
- B) 14 dias

C) 24 horas

D) 72 horas

RESPOSTA: Letra D

Questão 65

É considerado fator de risco para o desenvolvimento de câncer de ovário:

A) amamentação

B) mutação do gene BRCA 2

C) gestação em idade materna inferior a 25 anos

D) uso de anticoncepcionais orais com etinilestradiol de 35mcg

RESPOSTA: Letra B

Questão 66

Paciente de 28 anos percebe nódulo no seio e mastalgia. Ao exame físico, seu ginecologista identifica o nódulo, afirma que provavelmente se trata de uma alteração funcional benigna da mama e solicita ultrassonografia mamária para confirmação do diagnóstico. A característica ultrassonográfica que é compatível com o diagnóstico clínico consiste em:

A) diâmetro anteroposterior maior que o laterolateral

B) sombra acústica posterior

C) reforço acústico lateral

D) conteúdo anecoico

RESPOSTA: Letra D

Questão 67

Sobre a vacina do HPV, é correto afirmar que:

A) a vacina quadrivalente fornece proteção contra os subtipos 16, 18, 35 e 45

B) é disponibilizada na rede pública para meninas entre nove e 14 anos de idade

C) é contraindicada em mulheres com diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical

D) o esquema vacinal consiste em três doses com intervalo de 30 dias entre cada dose

RESPOSTA: Letra B

Questão 68

Sobre o câncer do colo uterino, é correto afirmar que:

A) as lesões precursoras demoram cerca de dois anos para progredir para câncer

B) é considerado o mais frequente tipo de câncer entre as mulheres

C) a maioria dos casos se desenvolve na zona de transformação

D) o adenocarcinoma representa cerca de 90% dos casos

RESPOSTA: Letra C

Questão 69

Jovem de 26 anos, sexualmente ativa, realiza o exame anualmente e seus últimos três exames apresentam resultados normais. Ela retorna ao consultório de ginecologia para buscar o resultado da colpocitologia, que evidencia: adequação da amostra satisfatória; presença de atipia de células escamosas de significado indeterminado provavelmente não neoplásica. Segundo o Ministério da Saúde, a conduta adequada para esse caso consiste em:

A) solicitar colposcopia

B) solicitar histeroscopia

C) repetir a colpocitologia em um ano

D) repetir a colpocitologia em seis meses

RESPOSTA: Letra C

Questão 70

Durante a investigação de casal infértil, é importante abordar os diversos fatores associados à infertilidade. Nesse caso, a principal hipótese é de:

A) infertilidade sem causa aparente

B) lesões tubárias

C) endometriose

D) anovulação

RESPOSTA: Letra A

Questão 71

Adolescente de 16 anos, primigesta, foi admitida na emergência com quadro de convulsão tônico-clônica generalizada na 34ª semana de gestação. Ao exame físico, apresenta PA = 170 x 120mmHg, FC = 92bpm, metrossístoles ausentes, AFU = 28cm, BCF = 100bpm, colo uterino longo, posterior e fechado, sem perdas vaginais. Nessa situação, além das medidas de suporte, a conduta consiste em:

A) prescrição de fenitoína

B) utilização de benzodiazepínico

C) administração de sulfato de magnésio

D) realização de cesariana de emergência

RESPOSTA: Letra C

Questão 72

Durante a gestação e puerpério, as modificações do sistema cardiovascular são marcantes, podendo levar a interpretações equivocadas dos achados clínicos e de exames complementares. Entre as alterações clínicas e de exames complementares, é correto citar:

- A) prolongamento do intervalo Q-T no eletrocardiograma
- B) aumento da silhueta cardíaca à radiografia de tórax
- C) desdobramento de 2ª bulha cardíaca
- D) presença de 4ª bulha cardíaca

RESPOSTA: Letra B

Questão 73

A doença hemolítica perinatal por incompatibilidade Rh é uma doença passível de prevenção através da adequada utilização de imunoglobulina anti D. Em paciente Rh negativo, a utilização de imunoglobulina anti D é indicada no(a):

- A) pós-parto vaginal, feto Rh negativo e coombs indireto negativo
- B) pós-cesariana, feto Rh positivo e coombs indireto positivo
- C) pós-gestação ectópica e parceiro Rh positivo
- D) pós-amniocentese e parceiro Rh negativo

RESPOSTA: Letra C

Questão 74

A sepse neonatal tem recebido muita atenção nos últimos anos, devido às suas consequências e à disponibilidade de medidas visando sua prevenção. Entre elas, o uso de profilaxia antimicrobiana intraparto para prevenção de infecção neonatal por Streptococcus do Grupo B (GBS) merece destaque. Em pacientes com cultura retovaginal para GBS desconhecida, uma das situações que NÃO indicam a profilaxia antimicrobiana intraparto é:

- A) gestante internada para cesariana eletiva, com bolsa íntegra
- B) paciente com urinocultura positiva no primeiro trimestre da gestação
- C) gestante em trabalho de parto com neomorto anterior por sepse neonatal precoce por GBS
- D) paciente internada para indução do parto com amniorrexe prematura com 35 semanas de gestação

RESPOSTA: Letra A

Questão 75

A sífilis congênita é uma doença passível de prevenção, com diagnóstico e tratamento efetivos durante a gestação. Entretanto, esta continua sendo um importante problema de saúde pública, com números crescentes de casos nos últimos anos. Sobre a sífilis na gestação, é correto afirmar que:

- A) o seguimento de pacientes tratadas deve ser realizado através de testes treponêmicos, com periodicidade mensal
- B) pacientes com alergia a penicilina devem fazer uso de eritromicina, que também é eficaz para tratamento materno e fetal
- C) gestantes com tratamento há menos de 30 dias do parto são consideradas inadequadamente tratadas e, portanto, caso de sífilis congênita
- D) gestantes com cancro duro devem ser tratadas com penicilina benzatina em um total de três doses, com intervalo de uma semana entre cada dose

RESPOSTA: Letra C

Questão 76

Paciente no segundo dia pós-parto vaginal eutócico a termo, sem comorbidades e assintomática apresenta temperatura axilar de 37°C. Ao exame físico, encontra-se: corada e hidratada, hemodinamicamente estável. O útero está 5cm abaixo da cicatriz umbilical, contraído e com lóquios serossanguinolentos; o colo uterino está fechado, as mamas túrgidas. Os exames laboratoriais mostram leucometria = 25.000 com 4% de bastões, hemoglobina = 10,0 e ematócrito = 35%, sem outras alterações. Diante desse quadro, a orientação inicial é:

- A) ordenhar/esvaziar as mamas
- B) iniciar cefalosporina de primeira geração
- C) solicitar urinocultura para rastreio de infecção
- D) realizar de ultrassonografia transvaginal para rastreio de endometrite

RESPOSTA: Letra A

Questão 77

A indução do parto está indicada sempre que o risco intrauterino é maior que o extrauterino. Entre as CONTRAINDICAÇÕES para indução do parto, encontra-se o(a):

- A) corioamnionite
- B) pré-eclâmpsia grave
- C) carcinoma de colo estágio IB
- D) restrição de crescimento intrauterino

RESPOSTA: Letra C

Questão 78

Jovem de 19 anos, primigesta, é admitida com quadro de dor abdominal difusa de forte intensidade, sangramento vaginal e atraso menstrual. Ao exame físico, apresenta-se hipocorada 1+/4+, hidratada, PA = 120 x 70mmHg, FC = 85bpm, pulsos amplos e sem hipotensão postural. A ultrassonografia transvaginal mostra massa anexial de 5cm, com moderada quantidade de líquido em fundo de saco posterior e β -HCG de 7500mUI/ml. Diante da principal hipótese diagnóstica, a melhor conduta para esse caso é a realização de:

- A) metotrexate intramuscular
- B) salpingectomia laparoscópica
- C) aspiração manual intrauterina
- D) acompanhamento seriado de β -HCG

RESPOSTA: Letra B

Questão 79

Traumatismos resultantes de acidentes automobilísticos ou de violência urbana são realidades em nossa sociedade e o atendimento à gestante vítima de trauma apresenta algumas particularidades. Com relação ao atendimento da gestante, é correto afirmar que:

- A) a tocólise deve ser realizada tão logo a paciente seja estabilizada, visando a prevenção de parto prematuro
- B) em virtude de risco de efeitos teratogênicos e do aumento da mortalidade fetal, os exames radiográficos são proscritos
- C) a realização de cesariana peri-mortem está indicada em gestações com mais de 20 semanas após, no mínimo, dez minutos de ressuscitação cardiopulmonar sem retorno da circulação
- D) em caso de parada cardiorrespiratória, a massagem cardíaca externa deve ser realizada na gestante inclinada 15° a 30° para esquerda ou com desvio manual do útero para esse lado

RESPOSTA: Letra D

Questão 80

Paciente com 42 semanas e um dia de gestação e assintomática é atendida na maternidade. O exame obstétrico revela: metrossístoles ausentes, tônus uterino normal, BCF = 142bpm, colo uterino amolecido, posterior, 50% apagado, 2cm de dilatação, apresentação cefálica em plano -2 de De Lee. A ultrassonografia evidencia feto único, cefálico, peso estimado de 3.800g, oligodramnia (maior bolsão vertical = 1,0) e cardiotocografia tranquilizadora (categoria 1 do ACOG). Diante desse quadro, a melhor conduta é realizar:

- A) aceleração do parto com ocitocina

- B) indução do parto com misoprostol
- C) cesariana após término do jejum
- D) vigilância fetal seriada

RESPOSTA: Letra B

Questão 81

Analise as práticas clínicas na Atenção Primária enumeradas abaixo: I. Usar um teste de rastreamento e diagnóstico seguido por tratamento; II. Usar estratégias de tratamento que limitem consequências adversas da doença; III. Eliminar fatores de risco, remover causas ou aumentar a resistência à doença; IV. Otimizar os recursos em saúde e legitimizar o potencial terapêutico da demora permitida. As práticas acima correspondem, respectivamente, aos seguintes métodos de prevenção:

- A) secundário / terciário / primário / quaternário
- B) primário / secundário / terciário / quaternário
- C) quaternário / terciário / secundário / primário
- D) terciário / primário/ quaternário / secundário

RESPOSTA: Letra A

Questão 82

Mulher de 33 anos tem desejo de fazer academia e não apresenta doença de base. Para emitir um atestado de liberação para atividade física, o procedimento mais adequado é realizar:

- A) ecocardiograma
- B) teste ergométrico
- C) perfil lipídico e hemograma
- D) anamnese e exame físico completo

RESPOSTA: Letra D

Questão 83

Homem de 67 anos tem história de infarto agudo do miocárdio há dois anos, hipertensão arterial, obesidade e tabagismo. Para a prevenção de novos eventos, a conduta mais indicada é:

- A) controlar os fatores de risco e iniciar estatina e aspirina
- B) orientar dieta hipocalórica e a evitar o stress emocional e proibir atividade física
- C) solicitar o teste oral de tolerância à glicose por apresentar síndrome metabólica
- D) cessar o tabagismo, controlar o peso e calcular o risco de Framingham anualmente

RESPOSTA: Letra A

Questão 84

A ansiedade é um problema frequente na Atenção Primária, estando entre os dez motivos mais comuns de consulta. Sobre o transtorno de ansiedade generalizado, é correto afirmar que:

- A) ocorre sempre em situação de estresse
- B) nervosismo, tremor e transpiração excessiva ocorrem em todos os casos
- C) em homens, está sempre associado a outros problemas de saúde mental
- D) em mulheres é mais comum, podendo ser difícil de identificar em idosos

RESPOSTA: Letra D

Questão 85

Em um estudo quantitativo, para avaliar a incidência de uma doença em um grupo de pessoas que, inicialmente, não a possuem, utiliza-se como medida de efeito:

- A) risco relativo
- B) risco absoluto
- C) risco atribuível
- D) razão de chances

RESPOSTA: Letra B

Questão 86

Uma das formas de violência escolar é o bullying. Os programas escolares de intervenção sobre o comportamento agressivo entre estudantes se mostram efetivos em:

- A) estudantes de baixo risco e bom relacionamento afetivo familiar
- B) crianças menores de cinco anos e maiores de 14 anos
- C) programas implantados por curto período de tempo
- D) programas com a participação de familiares

RESPOSTA: Letra B

Questão 87

O(s) aspecto(s) que deve(m) ser considerado(s), para que seja(m) feita(s) intervenção(ões) efetiva(s) no combate ao câncer de colo uterino e seu rastreamento, é (são):

- A) o procedimento da coloração de Papanicolau, pois é a principal estratégia de prevenção nos casos de lesões em estágio avançado
- B) a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que é fator determinante para o desenvolvimento desse tipo de câncer

C) adolescentes e meninas a partir dos nove anos, que devem receber a vacina quadrivalente em dose única

D) o tabagismo e o uso de anticoncepcionais orais, pois são fatores de risco associados a esse tipo de câncer

RESPOSTA: Letra D

Questão 88

A sensibilidade de um teste diagnóstico se caracteriza pela proporção de indivíduos:

A) com a doença cujo teste seja positivo

B) sem a doença cujo teste seja positivo

C) com a doença cujo teste seja negativo

D) sem a doença cujo teste seja negativo

RESPOSTA: Letra A

Questão 89

Todos podem ser cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) com base no princípio da:

A) equidade

B) integralidade

C) universalidade

D) participação da comunidade

RESPOSTA: Letra C

Questão 90

Para comparar o efeito de duas intervenções terapêuticas em uma determinada doença, deve-se utilizar, o seguinte tipo de estudo clínico:

A) estudo de coorte

B) estudo transversal

C) revisão sistemática

D) ensaio clínico randomizado

RESPOSTA: Letra D

Questão 91

O médico de família de uma Unidade Básica de Saúde, notando os altos índices de violência contra a mulher na comunidade adscrita, elabora um projeto de intervenção que deve:

- A) ser realizado por equipe técnica qualificada e sem a intervenção de moradores e familiares
- B) ser pontual devido ao grande impacto na saúde-adoecimento das mulheres
- C) ter a participação ativa da comunidade em todas as etapas do processo
- D) ter ampla divulgação na comunidade, podendo ter curta duração

RESPOSTA: Letra C

Questão 92

Em relação ao manejo e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, é necessário:

- A) iniciar o tratamento precoce e encaminhar o caso para uma clínica especializada
- B) intervir de maneira agressiva, mas com o envolvimento dos familiares no cuidado
- C) solicitar exames para avaliação das complicações e garantir a coordenação do cuidado
- D) garantir o acesso, o acompanhamento longitudinal e integral e estimular o autocuidado

RESPOSTA: Letra D

Questão 93

Mulher de 42 anos, cuja avó materna apresentou câncer de mama aos 80 anos, realizou mamografia com resultado de BI-RADS 3. Em relação ao rastreamento para câncer de mama, é correto afirmar que o(a):

- A) mamografia, como teste de rastreamento, tem benefícios inquestionáveis
- B) rastreamento foi bem indicado nesse caso, porque a paciente apresenta alto risco para o câncer de mama
- C) aconselhamento pré-teste informando os riscos e o seu significado é indicado, dando autonomia à paciente para realizá-lo ou não
- D) biopsia está indicada nesse caso, porque o resultado da mamografia demonstrou uma lesão de alta probabilidade para câncer de mama

RESPOSTA: Letra C

Questão 94

A relação conflituosa entre mãe e filho deve ser representada, no genograma, com uma linha:

- A) com dois cortes
- B) em zigzag
- C) tracejada
- D) contínua

RESPOSTA: Letra B

Questão 95

Mulher de 34 anos procura a clínica de família queixando-se de dor em região cervical anterior, irritabilidade, intolerância ao calor e palpitação há três dias. Também refere quadro de amidalite viral há três semanas. Ao exame clínico, foram observados: vermelhidão em área cervical, bócio difuso e doloroso, temperatura de 37,8°C e FC = 104bpm. Baseando nesses dados, a hipótese diagnóstica mais provável e os exames que podem confirmá-la, respectivamente, são:

- A) tireoidite de De Quervain / hemograma completo e VHS
- B) doença de Graves / T4 livre e anticorpos antiperoxidase
- C) tireoidite de Hashimoto / TSH e captação com Iodo radioativo
- D) tireotoxicose factícia / ultrassonografia e biópsia por agulha fina

RESPOSTA: Letra A

Questão 96

Mulher de 42 anos procura médico de família muito preocupada com o resultado de exame de rotina, que mostrou prolactina aumentada (PRL = 48ng/mL). A paciente nega irregularidade menstrual e galactorreia. Refere duas gestações prévias sem intercorrências. Baseando-se nesses dados, é correto afirmar que a melhor conduta diagnóstica é solicitar:

- A) TSH e avaliar uso de drogas que aumentem a PRL
- B) ultrassonografia transvaginal e testosterona
- C) tomografia de crânio e sela túrcica
- D) teste do progestágeno e FSH

RESPOSTA: Letra A

Questão 97

Mulher, viúva há cinco anos, doméstica aposentada, com dois filhos, cria e mora com seu neto de 15 anos, cuja mãe saiu de casa assim que ele nasceu. Com a implantação da equipe de saúde da família, pediu ao agente comunitário de saúde que marcasse uma consulta, pois estava sentindo dores no peito sempre que se aborrecia com o neto, pois não quer trabalhar nem estudar e está envolvido com pessoas em atividades ilícitas. Com base nesses dados, é correto afirmar que, essa família está vivenciando uma crise do tipo:

- A) família reconstituída
- B) ninho vazio
- C) acidental
- D) vital

RESPOSTA: Letra C

Questão 98

A notificação compulsória de doenças tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica. A listagem das doenças de notificação é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país. É considerada uma doença de notificação compulsória imediata (notificação em 24 horas):

- A) dengue
- B) leptospirose
- C) febre amarela
- D) sífilis congênita

RESPOSTA: Letra C

Questão 99

Em relação ao financiamento da saúde na atenção básica (AB) é correto afirmar que o(a):

- A) fonte de recursos do piso fixo da AB (PAB fixo) é o tesouro municipal
- B) valor do piso fixo da AB (PAB fixo) é proporcional à população do município
- C) valor do piso variável da AB (PAB variável) depende da arrecadação de impostos
- D) financiamento da AB é definido pelo conselho bi-partide de saúde em cada estado

RESPOSTA: Letra B

Questão 100

Após a confirmação do diagnóstico de tuberculose de uma merendeira de escola pública, os contatos foram convocados a comparecer à unidade de saúde. Para as crianças assintomáticas e com exame físico normal, deve ser solicitado:

- A) raio X de tórax e teste tuberculínico
- B) hemograma completo e raio X de tórax
- C) baciloscopia de escarro e teste tuberculínico
- D) retorno à unidade em caso de febre ou sintoma respiratório

RESPOSTA: Letra A